

# Herbizidstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

\*\*Dainageauflagen beachten (Einsatz ab 16.03.)

## Weizen u. Triticale auf Ackerfuchsschwanz Problemstandorten

**Atlantis Flex\*\*** 0,33 kg/ha + 1 l/ha \*5m

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit beachten !

AHL 30 l/ha oder  
SSA 10 kg/ha

+

oder  
**GentleMan**  
0,5 l/ha

## Roggen und Triticale

**Atlantis Flex\*\*** 0,20 kg/ha + 0,6 l/ha \*5m

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit beachten !

Nur  
Windhalmstandorte

## Folgende Käuterherbizide können zum Atlantis Flex gemischt werden:

### **Biathlon 4D**

70 g/ha + 1 l/ha Dash (Dash nicht mit AHL oder SSA beim Atlantis mischen!) \* 5m

### **Pointer Plus**

50 g/ha \* 5m

### **Finy** (Spezialprodukt gegen Hundskerbel)


30 g/ha \* 5m

## Auf Windhalmstandorten mit Kräutern folgendes Komplettprodukt:

### **Broadway + FHS**

150 gr/ha + 0,75 l/ha \* 5m

Nur  
Windhalmstandorte



# Bewährte Herbizidstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

\*\*Dainageauflagen beachten (Einsatz ab 16.03.)

## Winterweizen auf Ackerfuchsschwanz Problemstandorten

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>LS Niantic**</b> 0,5 kg/ha + 1 l/ha *5m<br><small>Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit beachten !</small> | + | <b>AHL 30 l/ha oder<br/>SSA 10 kg/ha</b> |
|   |   | <b>oder<br/>GentleMan<br/>0,5 l/ha</b>   |


### Gegen Gräser in Gerste

|   |
|---|
| <b>Axial 50 + Dash</b><br>1,2 l/ha    1,0 l/ha * 5m |
|---|

### zusätzlich gegen Kräuter:

|  |
|--|
| <b>Saracen Max + U 46 M</b><br>0,025 kg/ha + 1 l/ha * 5m |
|--|

|  |
|--|
| <b>Finy</b> (Spezialprodukt gegen Hundskerbel)<br>30 g/ha * 5m |
|--|



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und –auflagen sind zu beachten

# Herbizidstrategie Frühjahr 2023 in der Vegetationsruhe

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

Temperaturschwankungen beachten!

Drainageauflagen beachten!!!

Gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras-Arten in Gerste

**Axial 50** 1,2 l/ha \* 5m  
Möglichst nur in der Vegetationsruhe ausbringen!

Gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras-Arten, Windhalm u. Flughafer in Weizen, Roggen und Triticale


**Traxos** 1,25 l/ha \* 5m  
Möglichst nur in der Vegetationsruhe ausbringen!

Gegen **starken Ackerfuchsschwanz** und Weidelgras-Arten, Windhalm u. Flughafer in Weizen, Roggen und Triticale

**Traxos + Dash (Netzmittel)**  
1,2 l/ha + 1,0 l/ha \* 5m

Gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras-Arten, Windhalm u. Flughafer in Weizen, Roggen und Triticale + **Unkräuter**


**Avoxa**  
1,8 l/ha \* 5m



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten.

# Winterweizen - Fungizidstrategie Frühjahr 2023



\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten


# Wintergerste - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



# Triticale - Fungizidstrategie Frühjahr 2023


\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

# Roggen Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

# Winterweizen - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !  
Wachstumsregler

Bei Campesino Complice,  
RGT Reform, Informer u.ä.

**CCC**  
1,2 l/ha

**CCC + Moxa (Moddus)**  
0,5 l/ha + 0,2 l/ha

Bei hoher N- Nachlieferung

**Medax Top + Turbo**  
0,5+0,5 ltr/ha

Bei lageranfälligeren Sorten  
(KWS Talent, KWS Keitum,  
Asory etc.)

**CCC + Moddus**  
1 l/ha + 0,2 l/ha

**CCC + Protax**  
0,5 l/ha + 0,25 kg/ha

Blattdüngung

**Epsö Combitop**  
5 – 10 kg/ha


**Epsö Combitop**  
5 - 10 kg/ha

Nachbehandlung Unkräuter

**Ariane C**  
1,0 - 1,5l/ha \* 5m

**Saracen Max + U 46 M**  
0,25 g/ha + 1 l/ha \* 5m

**Duplosan Super**  
2 l/ha \* 5m




Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und –auflagen sind zu beachten

# Wintergerste - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !


Wachstumsregler



Nachbehandlung Unkräuter



Blattdüngung



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

# Wintergetreide - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

## Insektizide

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

**Nexide B4**  
80 ml/ha \*20 m


**Karate Zeon B4**  
75ml/ha \*5 m

**Decis forte \*\* B2**  
50 ml/ha \*10 m

**Mavrik Vita B4**  
200 ml/ha \*5 m

**Shock Down B2**  
200 ml/ha \*5 m

**Pirimor G B4**  
0,3 kg/ha \*5m




Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und –auflagen sind zu beachten

# Winterraps - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

Wachstumsregler / Fungizid



Blattdüngung

# Wann darf in 2023 Terbuthylazin (TBA) ausgebracht werden?

Wann wurde zuletzt TBA auf einer Fläche ausgebracht?

**TBA Ja:** es wurde angewendet/darf wieder angewendet werden

**TBA Nein:** es wurde nicht angewendet/darf nicht angewendet werden

| 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TBA Ja   | TBA Ja   | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein |
| TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein |
| TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein |
| TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   |
| TBA Ja   | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   |
| TBA Ja   | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein | TBA Ja   | TBA Nein | TBA Nein |

Terbuthylazin haltige PSM sind: Aspect; Calaris; Click Pro; Gardo Gold; Spectrum Gold; Successor T sowie Unterzulassungen und Importprodukte

# Wann darf in 2023 Nicosulfuron ausgebracht werden?

Nicosulfuron darf nur alle 2 Jahre auf der gleichen Fläche angewendet werden!

**Ja:** es wurde angewendet/darf wieder angewendet werden

**Nein:** es wurde nicht angewendet/darf nicht angewendet werden

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ja   | Nein | Ja   | Nein | Ja   | Nein | Ja   | Nein |
| Nein | Ja   | Nein | Ja   | Nein | Ja   | Nein | Ja   |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |


Nicosulfuron-haltige PSM sind: Nicogan, Motivell forte, Kanos, Arigo, Elumis, Ikanos, ...

# Mais - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023


\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

## Herbizide

### Spritzfolge



### Einfachbehandlung




# Terbuthylazin freie Strategien

## Mais - Pflanzenschutzstrategie Frühjahr 2023


\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !

### Herbizide - kostenoptimierte Strategie



#### Spritzfolge



#### Disteln Nachbehandlung




#### Vorauflaufbehandlung bei Mais-Bohnen Gemenge



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und -auflagen sind zu beachten

# Sojabohnen - Herbizidstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen in NRW !



Quelle: EURALIS Saaten

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Die Anwendungsbestimmungen und –auflagen sind zu beachten

# Ackerbohnen - Herbizidstrategie Frühjahr 2023

\*angegebene Abstände bei Verwendung von Düsen mit einer Abdriftminderung von 90 % und 5m dauerhaft bewachsenem Grünstreifen !



## Gräser Nachbehandlung



## Vorauflauf Behandlung

bis max. 3 Tage vor dem Durchstoßen